



Farmaci a scuola: Gestione della crisi epilettica

Buona occasione per adeguata
integrazione scolastica del bambino
con problemi neurologici

Tratto da : Marilena Vecchi
Centro di Diagnosi e Cura dell' Epilessia Infantile
Clinica Pediatrica, Padova

Farmaci a scuola: obiettivi

- ❖ Continuità scolastica = *diritto allo studio*
- ❖ Salute e benessere all'interno della struttura scolastica
= *crescita psico-relazionale adeguata*





**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

EMANANO

LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Roma, 25.11.2005

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA
F.to MORATTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE
F.to STORACE

RACCOMANDAZIONI DI LINEE GUIDA

Art. 2 – *Tipologia degli interventi* – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle **autorizzazioni specifiche** rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale **somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.**

COSA FARE IN PRESENZA DI UNA CRISI CONVULSIVA NELL'ALUNNO EPILETTICO CON PRESCRIZIONE DI MicroPAM

MANTENERE LA CALMA !


- Chiedere l'aiuto di 1-2 colleghi e invitare i compagni ad uscire. Uno va a prendere subito il MicroPam.
- Distenderlo subito su un fianco.
- Guardare l'orologio per valutare la DURATA
- Allontanare oggetti che possono fargli male.
- Mettere qualcosa di morbido sotto la testa
- Stargli vicino e tranquillizzarlo

COSA NON FARE....

- **Non cercare di immobilizzarlo**
- Mettere fazzoletti in bocca
- Praticare la respirazione artificiale
- Rialzarlo appena terminata la crisi
- Dargli da bere a crisi respirata
- Somministrare farmaci a crisi terminata



POSIZIONE DI SICUREZZA





E se la crisi dura più di 3-4 minuti ?

**→ Intervento farmacologico
= somministrazione farmaci senza
discrezionalità e senza competenze
tecniche**

SCHEDA TECNICA: MicroPam®

Nome commerciale: MicroPam® (vecchio nome commerciale:

MicroNoan®) Principio attivo: Diazepam

Dosaggio: 5mg fino ai 3 anni, 10mg oltre i 3 anni. Flaconcino predosato

Somministrazione: Microclistere, uso rettale

Conservazione: conservare a temperatura inferiore ai 25°C. Dopo

l'apertura del foglio di alluminio conservare a temperatura inferiore ai

15°C. **CONSIGLIO:** tenere sempre a disposizione 2 flaconcini, nel caso in cui la prima dose

fosse espulsa, o vi fosse di fuoriuscita accidentale prima della somministrazione.



Posologia: 0,5 mg/Kg fino a massimo di 10 mg



Rimuovere la capsula di chiusura ruotandola delicatamente 2-3 volte senza strappare. Ungere il beccuccio.



Mettere il paziente in posizione prona, con un cuscino sotto l'addome, o di lato. Un bambino piccolo può essere disteso sulle ginocchia.



Durante la somministrazione tenere sempre il microcistere con il beccuccio inclinato verso il basso.



Questa è l'inclinazione corretta.
N.B. Non spremere il microcistere prima di avere inserito il beccuccio nell'ano.



Una volta inserito il beccuccio nell'ano, vuotare il microcistere premendolo tra il pollice e l'indice.



Estrarre il beccuccio dall'ano tenendo sempre schiacciato il microcistere. Tenere stretti i glutei per alcuni istanti per evitare la fuoriuscita della soluzione.



8. La presenza di un residuo di soluzione nel microcistere è normale; la dose somministrata è ugualmente corretta.

Quando chiamare il 118 ?

- Se la crisi dura più di 5 minuti
- Se vi è una seconda crisi a breve dalla prima
- Se vi sono segni di traumi

NON DIMENTICARSI DELLA ESPERIENZA DEI GENITORI!